

ТитаренкоАриана, 07.07.2012г.р.

Вес 23 кг, рост 126 см, площадь тела 0,88м<sup>2</sup>.

Поддерживающая терапия при нейробластоме начинается через 2 недели от завершения основного лечения:

Роаккутан (20мг) 160мг/м<sup>2</sup> = суточная доза 140мг = 7 капс в течение 14 дней, запивать водой или молоком.

Далее перерыв 14 дней.

Всего проводится 6 циклов, далее перерыв 3 мес, далее еще 3 цикла.

Контроль ОАК, биохимии крови (особенно обратить внимание на уровень кальция, мочевины и креатинина, печеночные пробы) 2 раза в мес.

Лейкоциты >2000/мм<sup>3</sup>, печёночная токсичность не более 2-ой степени, нормальный уровень кальция в сыворотке.

УЗИ ОБП ежемесячно в течение 1 года, далее 1 раз в 3 мес по месту жительства

Уровень НСЭ крови (нейронспецифическая энолаза) ежемесячно в течение 1 года, далее 1 раз в 3 мес по месту жительства

КТ ОГК + ОБП с контрастированием 1 раз в 6 мес, ОГК с контрастированием 1 раз в 3мес по месту жительства

ПЭТ/КТ

Сканирование скелета (MIBG)

MIBG – терапия

Явка в дневной стационар НЦПДХ через 3 мес по четвергам с 09-00ч до 12-00ч. При себе иметь: копию последней выписки, направление педиатра или онколога, справку об эпидокружении, данные обследований.

07.06.19.

Врач:



Нуржанова Г.А.