

## ЛИМФОБЛАСТНАЯ ЛИМФОМА NHL BFM 95 ПРОТОКОЛ I (1-36 ДНИ)

Имя и фамилия: Илья Долгих      Протокол №:      Стадия:  
Статус ЦНС:      Вес: 29      Поверхность тела: 1 -

1.День (03 03 2023 г)	60 мг Преднизолон 60 мг/м2/ день, начинается с 3 доз, используется без интервалов. 12 мг Метатриксат интратекально
8 День (            )	12...мг Метатриксат интратекально, <b>только если ЦНС (+)</b> 1.5. мг Винкристин 1.5мг/м2/г 20 мл 0,9% NaCl, ВВ медленно 30 мг Даунорубин 30 мг/м2/г в 100 мл 5% Декстрозе, хранить от солнечного света. ВВ введение в течение 1 часа
12.День (            )	мг Метатриксат интратекально ЕД L Asp 5000 ЕД/м2/г, 100 мл 0,9% NaCl ВВ введение в течение 1 часа
15. День (            )	мг Винкристин 1.5 мг/м2/г 20 мл 0,9 % NaCl медленное ВВ введение мг Даунорубин 30 мг/м2/г в 100 мл 5% Декстрозе, хранить от солнечного света. ВВ введение в течение 1 часа ЕД L Asp 5000 ЕД/м2/г в 100 мл 0,9%NaCl введение в течение 1 часа
18. День (            )	ЕД LAsp 5000ЕД/м2/г в 100 мл 0,9%NaCl ВВ введение в течение 1 часа
21.День (            )	ЕД LAsp 5000 ЕД/м2/г в 100 мл 0,9%NaCl , ВВ введение в течение 1 часа
22.День (            )	мг Метатриксат интратекально <b>sadese ЦНС (+) ise</b> мг Винкристин 1.5 мг/м2/г 20 мл 0,9 % NaCl ВВ введение в течение 1 часа Даунорубин 30 мг/м2/г в 100 мл 5% Декстрозе, хранить от солнечного света. ВВ введение в течение 1 часа
24. День (            )	ЕД LAsp 5000 ЕД/м2/г в 100 мл 0,9%NaCl , ВВ введение в течение 1 часа
27.День (            )	ЕД LAsp 5000ЕД/м2/г в 100 мл 0,9%NaCl, ВВ введение в течение 1 часа
29.День (            )	Начало уменьшения преднизолона      мг Метатриксат интратекально мг Vinknstin 1.5 мг/м2/г 20 мл 0,9 % NaCl медленное ВВ введение Даунорубин 30 мг/м2/г 100 мл 5% Декстрозе, хранить от солнечного света. ВВ введение в течение 1 часа
30.День (            )	<b>ЕД</b> LAsp 5 000ЕД/м2/г в 100 мл 0,9%NaCl, ВВ введение в течение 1 часа
33.День (            )	<b>ЕД</b> LAsp 5000 ЕД/м2/г в 100 мл 0,9 %NaCl, ВВ введение в течение 1 часа
34.День	ОЦЕНИВАНИЕ МЕСТ СКОПЛЕНИЯ ПО ДИАГНОЗУ если ответ менее 70% применить терапию ВСЕХ высоких рисков (ALL yiksek risk). Ответ >%70 = продолжение лечения про протоколу I (часть 36-64) <b>36. день терапии ЗАДЕРЖКА получения КТ</b>

Возраст пациента	<1 6мг.	≥ 1 года и <2 8мг	≥ 2 лет и <3 лет 10мг	≥ 3 лет 12мг
Доза интратекального				
Уменьшение преднизолона:				
День 29-31. (....-....)		мг	мг	мг
День 32-34. (....-....)		мг	мг	мг
День 35-37. (....-....)		мг	мг	мг
Дата проведения химиотерапии:	Печать врача			